

“Programa de inoculação da dose de reforço contra a COVID-19”

新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

- Destinatários: indivíduos qualificados que tenham concluído os procedimentos de vacinação há 6 meses
 - 1.ª fase : trabalhadores de lugares com risco elevado ou indivíduos com imunidade relativamente baixa ou imunodeprimidos moderados ou graves
 - 2.ª fase : Outras pessoas qualificadas
- **Tipos de inoculação :**
 - **Vacina inactivada da Sinopharm**
 - Pessoas com a idade igual ou superior a 18 anos e tenham completado as 2 doses da vacina há 6 meses;
 - **Vacina de BioNTech mRNA**
 - Indivíduos que tenham completado as 2 doses há 6 meses :
 - Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e que trabalham em lugares de alto risco
 - Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos com função imunológica relativamente baixa
 - Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que residem em instituições ou outros ambientes de vida colectiva
 - Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que pretendam viajar para áreas ou países de alto risco
 - Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos
- **Local de inoculação : Nos 18 postos de vacinação contra a COVID-19 em Macau**
- **Data de inoculação :**
 - 1.ª fase : a marcação da primeira fase será disponibilizada a partir do dia 8 de Novembro, pelas 9h00, e a vacinação terá início às 9h00 do dia 9 de Novembro
 - 2.ª fase : A anunciar posteriormente

新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

Destinatários da 1.ª fase de vacinação (Vacinação das 3 doses recomendada)

- **Trabalhadores em lugares de alto risco**

1. Nos postos fronteiriços;
2. Tripulação de linha aérea;
3. Locais de observação médica;
4. Instituições médicas;
5. Bombeiros ou outros transportadores que encaminham as pessoas para observação médica e com teste de ácido nucleico com resultado positivo;
6. Pessoas contactam sempre com o público
7. Trabalhadores em outros postos de trabalho de alto risco, como pessoal relacionado aos produtos da cadeia de frio;
8. Pessoas com necessidades de deslocar-se a regiões de alto risco em situação urgente;

- **Pessoas com função imunológica relativamente baixa**

1. Cancro;
2. Doença cerebrovascular, como acidente vascular cerebral;
3. Obesidade;
4. Doença de obstrução pulmonar crónica;
5. Diabetes (tipo 1 e tipo 2)
6. Doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana ou cardiomiopatia;
7. Doença renal crónica;
8. Fumadores ou ex-fumadores

新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

Destinatários da 1.ª fase de vacinação (recomenda-se a vacinação de 3 e 4 doses)

- Pessoas com 12 anos ou mais, com imunossupressão moderada ou grave, incluindo:
 1. Pacientes com cancro estão em tratamento oncológico de maneira dinâmica ;
 2. Tenham realizado transplante de órgão e estão a administrar medicamentos imunossupressores;
 3. Tenham realizado transplante de células-tronco há menos de 2 anos ou ainda estejam a administrar medicamentos imunossupressores;
 4. Com imunodeficiência primária moderada ou grave (como síndrome de DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich)
 5. Com infecção por HIV em fase avançada ou não tratada medicamente;
 6. Com tratamento activo com corticosteroides em altas doses ou outras drogas que podem suprimir a resposta imunitária;

- **Sugestões concretas:**
 - 28 dias após a 2.ª dose, administração de dose da 3.ª dose (dose adicional, que pertence à dose estendida da série de vacinação inicial)
 - Administração de 4ª dose (dose de reforço), 6 meses após a 3ª dose

新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

Escolhas de dose de reforço

- Recomenda-se que seja dada a prioridade à vacina produzida pela mesma técnica
- As vacinas podem ser escolhidas através de diversas técnicas de acordo com a vontade individual
- Antes da vacinação, é necessário assinatura de termo de consentimento

Os indivíduos que não podem administrar, temporariamente, a dose de reforço

1. Pessoas menores de 12 anos
2. Pessoas com idades compreendidas entre 12 a 17 anos que não são imunes, de modo moderado ou grave;
3. Pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos e tenham administrado duas (2) doses de BNT mRNA não pertencentes a grupos de alto risco;
4. Pessoas com série de vacinação inicial para adenovírus (com base em 1 ou 2 doses diferentes de vacina)
 - Pessoas que administraram uma (1) dose no Interior da China é recomendado administrar a dose de reforço no Interior da China e não serão aceites para serem vacinadas em Macau.