

表一 2017年第一次全澳家居蚊媒孳生源調查各區登革熱病媒指數

區域	家居房屋指數	家居布氏指數	家居容器指數
筷子基	2.6%	2.6	5.4%
黑沙環	1.0%	1.0	0.9%
氹仔海洋	0	0	0
湖畔嘉模	0	0	0
風順堂	3.1%	3.1	5.3%
海傍	0	0	0
塔石	0	0	0
平均	1.1%	1.1	0.8%

表二 歷年全澳家居蚊媒孳生源調查登革熱病媒指數的比較

年份	第一次 1)			第二次 2)		
	家居布氏指數	家居房屋指數	家居容器指數	家居布氏指數	家居房屋指數	家居容器指數
2002	10.4	7.0%	3.6%	7.4	5.6%	3.1%
2003	6.4	4.2%	3.0%	5.0	3.9%	3.1%
2004	7.5	5.4%	6.9%	3.3	2.7%	1.8%
2005	3.0	2.5%	1.7%	3.3	2.2%	2.2%
2006	2.5	1.0%	1.9%	1.5	1.5%	1.1%
2007	4.2	1.7%	2.5%	5.2	2.5%	3.4%
2008	5.5	2.8%	2.4%	3.7	2.2%	2.6%
2009	2.3	2.2%	1.6%	3.3	2.0%	2.9%
2010	2.3	1.8%	1.6%	1.0	1.0%	0.6%
2011	2.0	1.5%	0.9%	3.0	1.5%	1.9%
2012	1.2	1.2%	0.8%	4.8	4.8%	5.1%
2013	1.0	1.0%	0.9%	2.0	1.4%	1.3%
2014	2.0	1.7%	1.5%	0.3	0.3%	0.2%
2015	1.4	1.4%	0.9%	2.0	2.0%	0.8%
2016	--	--	--	1.4	1.1%	0.8%
2017	1.1	1.1%	0.8%			

注: 1) 除 2003 年、2013 年和 2014 年在 7 月份進行外，其他年份均在 6 月份進行

2) 除 2004 年、2009 年和 2013 年在 10 月份進行外，其他年份均在 9 月份進行

表三 2017年第一次全澳大廈公共地方蚊媒孳生源調查各區登革熱病媒指數

區域	大廈布氏指數	大廈容器指數
筷子基	0	0
黑沙環	0	0
氹仔海洋	2.2	22.2%
湖畔嘉模	0	0
風順堂	2.2	22.2%
海傍	3.1	14.3%
塔石	10.4	10.9%
平均	1.8	9.9%